

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ラクリシアクリーム 口唇ヘルペスの再発治療薬
2	成分・分量	アシクロビル 1g 中 50mg
3	用法・用量	1日3～5回、適量を患部に塗布する。 (唇やその周りにピリピリ、チクチク等の違和感をおぼえたら、すぐに塗布する)
4	効能・効果	口唇ヘルペスの再発 (過去に医師の診断・治療を受けた方に限る)
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<p>*してはいけないこと</p> <p>1、次の人は使用しないでください</p> <p>1)初めて発疹したと思われる人、患部が広範囲の人、2)本剤又は本剤の成分あるいはバラシクロビル塩酸製剤によりアレルギー症状を起こしたことがある人、</p> <p>3)6歳未満の乳幼児</p> <p>2、次の部位には使用しないでください</p> <p>1)目や目の周囲、2)唇とその周囲を除く部位</p> <p>*相談すること</p> <p>1、次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。</p> <p>1)医師の治療を受けている人、2)妊娠又は妊娠していると思われる人、3)授乳中の人、4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人、5)湿潤やただれがひどい人、6)アトピー性皮膚炎の人</p> <p>2、使用后、次の症状あらわれた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師または薬剤師に相談してください</p> <p>皮膚に発疹、発赤、はれ、かゆみ、かぶれ、刺激感、疼痛、乾燥、灼熱感、落屑(フケ、アカのような皮膚のはがれ)、じんましん</p> <p>3、5日間位使用しても症状がよくなる場合、又はひどくなる場合は、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください</p>
6	薬剤師が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。