

2014年3月改訂（記載要領変更に伴う改訂）

ご使用に際して、この説明書を必ず読んでください。また、必要なときに読めるよう、大切に保管してください。用法・用量についての注意、使用方法などについては裏面をよく読んでください。

すぐ乾く2度ぬりタイプ 強い皮膜でキズを守る 液体ばんそうこう

大木の

リュウバン^sヘラつき

第3類医薬品 10mL
販売名：大木の流絆S

大木の流絆Sは、強い皮膜をつくって傷を守る、すぐ乾く液体ばんそうこう（流動絆創膏）です。付属のヘラに少量とり、傷に薄くぬると、一瞬しみますが乾くと治まり、透明な皮膜ができて、ばい菌の侵入を防ぎ、水やお湯などの刺激から傷を守ります。2度ぬりすると一層はがれにくくなります。毎日の水仕事などから手をいたわり、スポーツやレジャーのお供に、ご家庭や職場の常備薬として、お役立てください。

特 長

- ①透明で目立たず、2度ぬりではがれにくい強い皮膜をつくる
- ②ヘラ付きだからぬりやすく、すぐ乾き、薄くぬれる
- ③ひび、あかぎれ、さかむけ、小きりきず、靴ずれなどのすり傷に、さっとお手当ができる

こんなときに…



使用上の注意



してはいけないこと 守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。

1. 次の部位には使用しないでください。
（1）目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等） （2）ただれ、化膿及び傷口の大きな患部、出血している患部 （3）湿疹



相談すること

1. 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
（1）本人又は家族がアレルギー体質の人 （2）薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ

効能・効果

ひび、あかぎれ、さかむけ、小きりきず、すりきず

用法・用量


患部を清潔にし、傷部のみに適量をぬり、そのまま静かに乾燥させてください。

用法・用量についての注意

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
2. 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診察を受けてください。
3. 本剤は、外用にのみ使用し、絶対に内服しないでください。
4. 患部に血液や水分がついていると薬液がつきにくいので、よくふきとってください。

使用方法

1. 容器の先を上にして、肩の部分を軽く持ち、キャップのピンで穴を開けてください。
※容器を強く押し下たり下にするすると、薬液が多量に出ることがあるのでご注意ください。
2. 容器の先を上にしたまま、ヘラにすくいとり、傷に薄くぬってください。
3. 2度ぬりすると、一層はがれにくく強い皮膜になります。
4. 皮膜は自然にはがれますが、急いではがしたいときは、薬液を皮膜の上にぬり、溶かしながら乾ききる前にふき取ってください。マニキュア除光液でもとれます。
5. 容器を底から折ると出しやすくなりますが、折り直すと破れることがあります。
6. 使用後は、キャップをしっかり締めてください。（薬液が固まる恐れがあります）容器の口部、ねじ部、キャップの内側に、薬液が付着したときは、清潔なティッシュや綿棒等でふき取ってからキャップを締めてください。



成分・分量

成 分	分量(100g中)
ピロキシリン	12.0g

添加物としてヒマシ油、エタノール、酢酸ブチル、その他1成分を含有する。

保管及び取扱上の注意

1. 小児の手の届かない所に保管してください。
2. 直射日光をさけ、涼しい所に保管してください。
3. 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
4. 火気に近づけないでください。
5. ヘラは薬液をふき取ってから箱に戻し、清潔にしてご使用ください。
6. 衣服・家具等につくと非常にとれにくいので、つかないように注意してください。
7. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、開封後はなるべく早くお使いください。
8. 揮発しやすい成分が含まれるため、使用しているうちに固まり、使えなくなる場合があります。

お客様相談室 ☎ 03-3256-5051
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎ 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元



大木製薬株式会社
東京都千代田区神田鍛冶町3-3

13042008

Test Report

To: OHKI PHARMACEUTICAL Co.,Ltd.

3-3 Kandakajicho Chiyoda-ku,
Tokyo 101-0045 Japan
Phone : +81-3-3256-5051

ENVIRONMENTAL TECHNICAL Co., Ltd.
Analysis Center Laboratory Section

1709-1 Kaneko-machi, Takasaki-shi,
Gunma, 370-3511 Japan
Phone : +81-27-372-5111
Fax : +81-27-372-5001

The test result relate only to the items tested.

Sample name	OHKI NO RYUBAN S		
Subject	—		
Sampler	—		
Test items	Test results	Test method	
I-131	Not Detected less than 10 (Bq/kg)	"Gamma-ray Spectrometry using Germanium Semiconductor Detector (Radiation Measurement Method Series 7) (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology)	
Cs-134	Not Detected less than 10 (Bq/kg)		
Cs-137	Not Detected less than 10 (Bq/kg)		
Note • Measurement Instruments : Ge Detector System GC2020-7500SL-2002CSL Multi Channel Analyzer Lynx (Made by Canberra Industries, Inc) • Measuring Time : 1693 sec • Base Date : 2018.4.26 17:17 • Container : Marinelli Beaker (2 Liter) • Sample Weight : 1640 g			
※:The detection limit level calculated it by the Cooper method. The test report shall not be reproduced except in full,without written approval of the laboratory.			
Sample receiving date	2018.4.25	Date of issue	2018.4.27
Analysis completed date	2018.4.27	Report No.	e232956
Analysis manager	Makoto Kada		
Analyzed by	Gyounin Takagishi		

試験報告書

大木製薬株式会社 様

〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3
TEL: 03-3256-5051

株式会社



〒370-3511 群馬県高崎市金古町1709-1
TEL: 027-372-5111
FAX: 027-372-5001

本試験結果は供試品目のみに関するものです。

試料名	大木の流絆S		
件名	—		
採取者	—		
試験項目	試験結果	試験方法	
I-131	不検出 10 未満 (Bq/kg)	ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー (放射能測定法シリーズ 7) (平成4年 文部科学省原子力安全課防災環境対策室)	
Cs-134	不検出 10 未満 (Bq/kg)		
Cs-137	不検出 10 未満 (Bq/kg)		
備考 ・測定装置: ゲルマニウム半導体検出器: GC2020-7500SL-2002CSL マルチチャンネルアナライザー: Lynx (CANBERRA社製) ・測定時間: 1693 秒 ・基準日: 2018年4月26日 17時17分 ・測定容器: 2Lマリネリ容器 ・試料量: 1640 g * 検出限界値は、Cooper法にて算出しました。 試験所の書面による承認がない限り、試験報告書の一部分だけを複製してはなりません。			
受付日	2018.4.25	発行日	2018.4.27
測定完了日	2018.4.27	報告書番号	232956e
計量管理者	加田 誠 		
測定担当者	高岸		